



**VI SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE**  
6ª Mostra de Experiências Exitosas do município de Catanduva | SP - Dr. Carlos Roberto Surian

1) **Título da Experiência :** Rastreamento de Sífilis em População com Menos de 30 anos de Idade em População Adscrita de Equipe de Saúde da Família

2) **Tema:** Rastreamento de Sífilis na Atenção Primária

3) **Início da Experiência:** 07/2024

4) **Eixo temático:** Atenção Básica (AB)

**5) Dados dos Autores:**

CPF 397.422.838-18

Nome completo: Caroline Falcão da Cruz

Email: carol-falcao@hotmail.com

Telefone: (17)991414501

Instituição: USF Drº Carlos Alberto Surian – Equipe III

CPF 468.156.728-08

Nome completo: Eduardo Toledo Rodrigues

Email: eduardotoledorodrigues@gmail.com

Telefone: (17) 996249871

Instituição: USF Drº Carlos Alberto Surian – Equipe III

Co-autora:

CPF 393.633.058-13

Nome completo: Eduarda Oliveira de Aro Margonar

Email: dudamargonar@icloud.com

Telefone: (17) 997850465

Instituição: USF Drº Carlos Alberto Surian – Equipe III



VI SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE  
6ª Mostra de Experiências Exitosas do município de Catanduva | SP - Dr. Carlos Roberto Surian

## **6) Dados do Trabalho**

Unidade: USF Dr. Carlos Roberto Surian

Endereço: Rua das Pitangas, 330

Telefone: (17) 997663138

Celular: (17) 997663138

e-mail: [usf.carlossurian@catanduva.sp.gov.br](mailto:usf.carlossurian@catanduva.sp.gov.br)

Autor (es): Eduardo Toledo Rodrigues, Caroline Falcão da Cruz.

Co-autora: Eduarda Oliveira Aro Margonar.

## **INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA :**

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pelo *Treponema Pallidum* (TP). A fase primária da doença é caracterizada por uma úlcera indolor (cancro duro) no local de inoculação. Os anticorpos contra TP surgem até 3 dias após a lesão primária e permanecem detectáveis até o tratamento. Entre 2012 e 2018, o Ministério da Saúde observou um aumento nas taxas de detecção de sífilis, tanto em adultos quanto em gestantes, além do aumento na incidência de sífilis congênita. Este crescimento é atribuído ao maior acesso à testagem rápida, à desinformação e ao uso inadequado de preservativos. Além disso, a redução do uso da penicilina devido ao desabastecimento agrava a situação. O rastreamento é uma estratégia para diagnosticar doenças precocemente e permitir tratamentos oportunos, reduzindo a morbimortalidade. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas recomendam o rastreio populacional de sífilis e HIV para pessoas com menos de 30 anos, dada a alta prevalência entre esse grupo. O teste Syphilis Ultra Rapid Test Device, disponível nas Unidades de Saúde da Família, é altamente sensível e específico, com cerca de 99,5% de sensibilidade e 99,8% de especificidade, e é utilizado para detectar anticorpos contra o *Treponema Pallidum* em sangue, soro ou plasma.



## VI SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE

6ª Mostra de Experiências Exitosas do município de Catanduva | SP - Dr. Carlos Roberto Surian

### **OBJETIVO (s):**

Objetivou-se avaliar a prevalência de sífilis na população não gestante adscrita na equipe III da USF Dr. Carlos Roberto Surian nos meses de julho, agosto e setembro por meio da realização de testes rápidos em todos os pacientes abaixo de 30 anos de idade que passaram por atendimento em demanda espontânea no período citado. A medida de prevalência possibilitou o atendimento e tratamento oportuno da Sífilis na população, agindo diretamente na cadeia de transmissão da doença.

O tratamento foi realizado de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), baseado na classificação da sífilis como primária, latente recente e latente indeterminada.

O medicamento de escolha foi a penicilina benzatina com dose adequada de acordo com a classificação da Sífilis pelo protocolo.

### **METODOLOGIA :**

Foram analisados os dados de prevalência da sífilis, bem como sexo dos indivíduos testados e uso de preservativo durante a relação sexual. Tais dados foram inseridos em planilhas para possibilitar a construção de gráficos de análise. A importância desta coleta de dados se baseia na formulação de uma estratégia específica para a população adscrita na Unidade de Saúde da Família (USF) “Dr. Carlos Roberto Surian” afim de reduzir a morbimortalidade por Sífilis no território da unidade.

### **RESULTADO (s) :**

Foram realizados no total 150 testes rápidos para sífilis em pacientes não gestantes adscritos da Equipe III da USF “Dr. Carlos Roberto Surian”, destes, 80 eram do sexo masculino e 70 eram do sexo feminino. Na análise de prevalência da sífilis houveram 6 casos positivos confirmados por sorologia e iniciado o tratamento em tempo oportuno. Quanto ao uso de preservativos, cerca de 50 pacientes fazem uso deste nas relações sexuais, o que se traduz em uma parcela de 33% dos pacientes testados.

Na população de gestantes da Equipe III houve 1 diagnóstico de sífilis em um total de 18 gestantes em acompanhamento Pré-Natal, confirmado por sorologia, realizado o tratamento adequado com penicilina e feito o seguimento com titulação de VDRL mensal.





### VI SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE

6ª Mostra de Experiências Exitosas do município de Catanduva | SP - Dr. Carlos Roberto Surian

A prevalência estimada de detecção de sífilis em gestantes é de 21,5 por 100 mil habitantes segundo dados do Ministério da Saúde, que quando comparado a detecção de sífilis em gestante na equipe III com valores de 5,5% (1 diagnóstico em 18 gestantes) ou 5.555,55 a cada 100 mil habitantes apresenta risco relativo de 258,37 vezes maior de detecção na população da USF.

A população total estimada adscrita da Equipe III é de 2664, e destes, 2080 são cadastrados na USF. A prevalência de sífilis dentre os testados foi calculada em torno de 4%.





### **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

De acordo com os dados levantados, nota-se que o perfil da população estudada é marcado por intensa vulnerabilidade social com risco relativo de sífilis muito maior que nos dados trazidos para população geral de 2018 pelo Ministério da Saúde. Portanto, se faz necessária a formulação de estratégias para contenção do avanço da Sífilis na população adscrita da unidade, bem como da necessidade de cuidados integrais com a população para assim reduzir a morbimortalidade por sífilis no território. A prevalência de sífilis em gestante foi maior que a média, mas que a prevalência de sífilis na população assistida pela unidade de saúde foi abaixo da média, necessitando de uma abordagem mais ampla para a população assistida para detecção precoce e interrupção da cadeia de transmissão da sífilis no território.



VI SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE  
6ª Mostra de Experiências Exitosas do município de Catanduva | SP - Dr. Carlos Roberto Surian

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:** RAMOS JR, Alberto Novaes. Persistência da sífilis como desafio para a saúde pública no Brasil: o caminho é fortalecer o SUS, em defesa da democracia e da vida. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, n. 5, p. PT069022, 2022.

DIRETRIZES, E. Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). 2022.

DOMINGUES, Carmen Silvia Bruniera et al. Brazilian Protocol for Sexually Transmitted Infections, 2020: congenital syphilis and child exposed to syphilis. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 54, n. suppl 1, p. e2020597, 2021.

GRUMACH, Anete S. et al. A (des) informação relativa à aplicação da penicilina na rede do sistema de saúde do Brasil: o caso da sífilis. **Brazilian Journal of Sexually Transmitted Diseases**, v. 19, n. 3-4, p. 120-127, 2007.



VI SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE  
6ª Mostra de Experiências Exitosas do município de Catanduva | SP - Dr. Carlos Roberto Surian